

Økt drikkelyst hos hund

Det snakkes ikke så ofte om økt drikkelyst hos hund, bortsett fra i de tilfeller hvor man mistenker livmorbetennelse hos tisper.

Livmorbetennelse forekommer i to ulike former, åpen og lukket. Ved en åpen livmorbetennelse vil det normalt renne ut illeluktende puss, mens en lukket betennelse er vanskeligere å oppdage og når man først oppdager infeksjonen så har ofte livmoren sprukket og da står det om livet.

Kjennetegnene ved livmorbetennelse kan være økt drikkelyst, økt tissing, nedsatt allmenntilstand og dårlig appetitt og feber. Disse symptomene kan opptre alene eller i fellesskap. Livmorbetennelse kan oppstå både under og mellom løpetider og jo eldre en tisper blir, desto mer utsatt er hun for å få livmorbetennelse. Nedsatt matlyst i seg selv, kan også være tegn på innbilt svangerskap så dette symptomet alene trenger ikke å bety at det er snakk om livmorbetennelse.

Økt drikkelyst kan imidlertid også være tegn på andre tilstander eller sykdommer

Det aller første man tenker på, dersom hunden er ung, er at den har urinveisinfeksjon. Normalt vil man se tegn på urinveisinfeksjon i form av hyppig vannlating og fordi den tisser ofte, så vil den også drikke mer.

Urinveisinfeksjon kan oppstå både hos yngre og eldre hunder og kan enkelt diagnostiseres ved å ta med urinprøve for analyse hos veterinær.

Men det finnes også flere andre sykdommer eller tilstander som gir økt drikkelyst og noen av de kan vi nevne her:

Diabetes

Diabetes Mellitus, sukkersyke, er relativt vanlig hos hund og rammer oftest middelaldrende eller eldre hunder. Sykdommen rammer oftest tisper, og overvektige hunder har større risiko for å utvikle sykdommen enn slanke hunder.

Normalt reguleres blodsukkernivået hovedsakelig av insulin, som produseres i bukspyttkjertelen. Ved diabetes er blodsukkernivået unormalt høyt. Det er to grunner til dette:

1. Svekket insulinproduksjon i bukspyttkjertene, diabetes type 1.
2. Kroppen klarer ikke å «svare» på insulinet, diabetes type 2.

Hunder med diabetes har vanligvis type 1.

Det kan være mange utløsende faktorer når det gjelder diabetes, blant annet infeksjoner, sykdommer i immunforsvaret, legemiddelbivirkninger og arvelige årsaker.

Diabetes er forårsaket av mangel på insulin i kroppen. Insulinet er viktig for å fjerne glukose (sukker) fra blodomløpet, og når det er mangel på insulin kan glukosen gå over i urinen. Glukosen trekker meg seg væske og dette fører igjen til økt tørst og økt vannlating.

Cushings syndrom

Cushings syndrom blir også kalt Hyperadrenocorticism, er en hormonell ubalanse som skyldes for høyt kortisolinnhold i blodomløpet. Symptomene kommer til syne over tid så den økte drikkelysten starter gradvis for så å øke. Mange eiere tror derfor at det bare dreier seg om den normale aldriingsprosessen. Under står listet symptomer som ofte opptrer sammen med økt drikkelyst:

1. Glupsk appetitt.
2. Tønneformet mage.
3. Muskelsvakhet.
4. Hudproblemer.

Nyresvikt

Nyrene har mange roller og en av de er å sørge for riktig tilgang på væske. Hydrering av kroppen er avhengig av å regulere «væskeforbruk» samt utskilling av væske. Ved dehydrering reagerer nyren med å spare væske, det betyr at alle avfallsstoffer som kroppen skal kvitte seg med, fortsatt må utskilles, men nyrene sørger da for å bruke minst mulig væske for å få skilt ut avfallsstoffene. Ved nedsatt nyrefunksjon vil nyrene har problemer med å konsentrere urinen og dette fører til økt drikkelyst.

Dehydrering

Dehydrering kan forekomme hos både yngre og eldre hunder og kan også være årsak til økt drikkelyst. Ubehandlet tilstand kan være livstruende. En hurtigtest kan fort vise om hunden er dehydrert. Ta tak i huden. Om huden trekker seg fort tilbake, er det ingen fare, men dersom huden blir stående så er hunden sterkt dehydrert og tilstanden kan fort bli kritisk. Dersom du mistenker at din hund er dehydrert, så må du umiddelbart oppsøke veterinær.

Når skal man reagere på økt drikkelyst?

Når en hund eldes, vil det ofte oppstå fysiske adferdsendringer. Endringene kan knapt være merkbare i starten slik at det er vanskelig å fange opp symptomer. Som en regel kan vi si at en hund som veier 10 kg vil drikke ca. en kopp pr. dag. Hvis man registrerer at hunder besøker vannskålen hyppigere enn tidligere, så bør man kanskje tenke på å ta en tur til veterinæren.

Diagnostisering av årsak til økt vanninntak

Din veterinær kan utføre forskjellige tester for å avgjøre hva som er årsak til økt drikkelyst.

Tester kan påvise følgende:

Nyresykdom:

Forhøyede nyreverdier.

Diabetes:

Forhøyet blodsukker og glukose i urinen.

Cushings syndrom:

Forhøyet leververdig ALP, endringer i antall hvite blodlegeméer og forhøyet kolesterol.

Dehydrering:

Positiv test av hud (hudturgortest), forhøyet leverprotein (Albumin), elektrolyttendring.

Om du skulle være i tvil om hunden har en av disse tilstandene, så ikke nøl med å ta kontakt med veterinær.

Vi skal heller ikke glemme at mange årsaker til økt drikkelyst, er helt normale. Hunden drikker mer under trening, når det er varmt og når det er høy luftfuktighet De kan også drikke mer om de for eksempel spiser tørr mat og likeledes vil væskebehovet ofte være lavere om de spiser våtfôr.